


C760 VIMEDIN PLUS

Preparat dezynfekcyjno-myjący

Skoncentrowany płyn przeznaczony do profesjonalnego zastosowania do mycia i dezynfekcji powierzchni w placówkach służby zdrowia, DPS (Domy Pomocy Społecznej), itp. do mycia i dezynfekcji ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego oraz placówkach gastronomicznych w tym powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (w tym wobec wirusów otoczkowych, MERS-CoV, MVA), bójcze wobec spor *Clostridium difficile* w obszarze ogólnym oraz działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (w tym wobec wirusów otoczkowych, MERS-CoV, MVA), bójcze wobec spor *Clostridium difficile* w obszarze medycznym.



Parametry produktu

Sposób użycia

Rozcieńczyć odpowiednio do zastosowania. Świeży roztwór należy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem i wymieniać go, jeśli roztwór stanie się widocznie zabrudzony lub rozcieńczony. Przeprowadzenie dezynfekcji w warunkach czystych wymaga usunięcia brudu i kurzu z powierzchni poddawanych dezynfekcji. Nakładać na powierzchnię przy pomocy mopa, rozpylacza spustowego (z wycieraniem lub bez), polewania i wycierania, namaczania lub niskociśnieniowego aplikatora piany. Powierzchnia musi pozostawać wilgotna przez cały czas kontaktu. Zdezynfekowane powierzchnie, mające kontakt z żywnością, spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania produktu. Stężenia skuteczne:

	Obszar ogólny: stężenie	Obszar ogólny: czas ekspozycji w temp. 20 stopni Celsjusza	Obszar medyczny: stężenie	Obszar medyczny: czas ekspozycji w temp. 20 stopni Celsjusza

Bakterie	25 ml / l	5 min.	25 ml / l warunki czyste	5 min.
Drożdże	20 ml / l	15 min.	3 ml / l 1 ml / l	5 min. 60 min.
Grzyby	40 ml / l	15 min.	-	-
Bójcze wobec spor Clostridium difficile	50 ml / l warunki czyste	60 min.	50 ml / l warunki czyste	60 min.
MERS-CoV	10 ml / l warunki czyste	5 min.	10 ml / l warunki czyste	5 min.
MVA	10 ml / l	5 min.	10 ml / l	5 min.
Adenowirus	20 ml / l warunki czyste	15 min.	20 ml / l 40 ml / l	60 ml / l 15 ml / l
Norowirus	20 ml / l warunki czyste	5 min.	20 ml / l warunki czyste	15 min.
Poliowirus	50 ml / l	60 min.	50 ml / l	60 min.

Skład

Chlorek didecylodimetyloamonium – 6,9 g/ 100 g.

Informacje o bezpieczeństwie

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+ P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość / pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje mające wpływ na klasyfikację: 2-aminoetanol. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania produktu. Okres ważności 24 m-ce od daty produkcji. Data i nr serii na opakowaniu.

Pozwolenie nr: 9218/23

UFI: NV90-5037-J001-WPPG

